

度和 度闭经（图）临床执业医师《妇产科学》辅导 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/295/2021_2022__E2_85_A0_E5_BA_A6_E5_92_8C_E2_c67_295681.htm 问题：36岁已婚妇女，闭经8月，查子宫稍小。肌注20mg黄体酮3日，未见撤退性流血。给予己烯雌酚1mg20日，后3天加安宫黄体酮10mg，有撤退性流血。应诊断：A 子宫性闭经 B 1度闭经 C 2度闭经 D 垂体性闭经 E 下丘脑性闭经 答案及解析：本题选C。 度闭经：子宫内膜已受一定量的雌激素作用，用孕激素后有撤退性子宫出血，提示卵巢具有分泌雌激素功能。 度闭经：子宫内膜未受雌激素影响，用孕激素后不出现撤退性子宫出血，提示卵巢分泌雌激素功能缺陷或停止。 孕激素试验：肌肉注射黄体酮100mg(每日20mg，连用5日，或100mg一次注射)。停药后又撤退流血者表明内有一定内源性雌激素水平，为度闭经；停药后无撤退性流血者可能存在两种情况。1. 度闭经，内源性雌激素水平低落；2. 子宫病变所致闭经。 雌激素试验：每日口服雌烯酚1mg或妊马雌酮1.25mg或雌二醇2mg。共服20日。最后5-7日口服甲羟孕酮，每日10mg。停药后有流血者可排除子宫性闭经；流血者则应再重复上述用药方法，停药仍无撤退性流血者可确定子宫性闭经。但如病史及妇科检查已排除子宫性闭经及下生殖道发育异常，此步骤可省略。 相关内容 闭经：amenorrhea 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com