

2011年肿瘤护理：乳腺癌化疗的输液护理护士资格考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_82_BF_c21_3068.htm

乳腺癌化疗的输液护理：根据医嘱正确配制药剂，如阿霉素必须用5%葡萄糖溶解，而用生理盐水则易结块不能完全溶解；根据医嘱正确配制药剂，如阿霉素必须用5%葡萄糖溶解，而用生理盐水则易结块不能完全溶解；环磷酰胺必须用生理盐水并延长溶解时间至溶液中透明结晶完全溶解。根据给药途径正确给药，如环磷酰胺、表阿霉素为静脉注射，氟尿嘧啶为静脉滴注须持续3~4小时。化疗前后和输入不同化疗药物时，都要用生理盐水50~100ml冲洗血管，可稀释残留于血管壁上的化疗药物，减少对局部组织刺激，有效预防静脉炎。静脉化疗前应检查回血确保通畅方可给予化疗药物，如有红肿、疼痛等不适应予及时处理。乳腺癌病人因淋巴回流受阻致患肢肿胀，6个月内患肢禁止输液，下肢静脉血流速度缓慢，化疗后易出现多处水泡、溃烂及静脉栓塞等并发症，因此病人从第一次化疗起就应注意静脉计划有序的应用。一旦化疗药物外渗，停止输液，保留针头尽可能回抽药物，用注射器抽取地塞米松5mg 0.25%利多卡因5ml在外渗部位处进行封闭注射，然后用冰袋或硫酸镁局部冷敷12~24小时，严防化疗药物渗漏致皮下组织坏死。特别推荐：[2011年护士考试报名时间](#) [2011年执业护士考试报名条件](#) 更多信息请访问：[护士考试辅导](#) 无忧通关班超值优惠价300元/人 [护士论坛](#) [护士在线题库](#) [护理学专业（护士）《相关专业知识》全真模拟试汇总](#) 相关推荐：[2011年肿瘤护理：肾癌患者](#)

放化疗护理 #0000ff>2011年肿瘤护理：肾肿瘤并发腔静脉癌栓
术前护理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详
细请访问 www.100test.com