

2011年护士资格考试《儿科护理学》必做习题(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E6_8A_A4_c21_3177.htm 精选护士资格考试儿科护理学历年常考真题，考生不可或缺的备考资料！

一、单选题(单选题，每题只有一个正确答案，一共20题，每题5分。)

1、属于被动免疫的措施是 () A.口服脊髓灰质炎疫苗 B.注射卡介苗 C.注射丙种球蛋白 D.注射麻疹疫苗 E.注射流脑疫苗 标准答案：C 解析：未接受主动免疫的易感者在接触传染病后，被给与相应的抗体，而立即获得免疫力，称之为被动免疫。常用制剂为免疫球蛋白等。

2、儿科治疗室消毒的间隔时间() A.每日一次 B.每日二次 C.两日一次 D.三日一次 E.一周一次 标准答案：B 解析：一般病室每周消毒一次，新生儿室、重症病室每日一次，治疗室每日2次，按时用消毒水清洁台面、床栏杆及地面。

3、一般患儿新住院3天后，每日测量体温() A. 4次 B. 3次 C. 2次 D. 1次 E. 0次 标准答案：C 解析：给患儿测体温、脉搏、呼吸，新入院患儿3日内每日测3次，以后每日测2次。危重、发热、低体温者则每四小时测一次，经退热处理后的小儿，应半小时重测体温一次。

4、为患儿测血压时，袖带的宽度为小儿上臂的() A.1/2 B.3/4 C.3/5 D.1/3 E.2/3 标准答案：E 解析：袖带的宽度为小儿上臂的2/3，袖带过宽。可使测得的血压数值偏低，过窄可使测得的血压偏高。

5、患尿布皮炎的局部皮肤皮疹溃破、脱皮，属于() A. 轻度 B. 重度：1度 C. 重度：2度 D. 重度：3度 E. 重度：4度 标准答案：C 解析：重度尿布皮炎根据红烂程度分3度：一度局部皮肤潮红伴皮疹。二度皮疹溃破脱皮。三度局部有大片糜烂或表皮剥脱，有时

继发感染。 6、 约束法的种类不包括() A.膝部约束法 B.手足约束法 C.肘部约束法 D.全身约束法 E. 手部约束法 标准答案： A 解析：约束法的种类包括：全身约束法、手足约束法、肘部约束法、手部约束法。 7、 臀红用红外线或灯泡照射时，灯泡距离臀部患处距离为() A.15cm B.20cm C.25cm D.35cm E.45cm 标准答案： D 解析：采用红外线或白炽灯照射皮炎局部时,功率为40瓦,灯泡距局部患处30-40cm，每日2次。 8、 为低体重儿进行蓝光治疗时，应调节床内温度为() A.22-24 B.25-28 C.29-31 D.32-36 E.37 标准答案： D 解析：治疗时，光疗床内温度为30-32（早产儿和低体重儿32-36），湿度保持55%-65%，灯管距离患儿为30-50cm。 9、 以下不属于患儿住院护理的内容() A. 清洁卫生护理 B. 对患儿进行健康体检，采集健康史 C. 测量生命体征 D. 对静脉输液患儿加强巡视 E. 为患儿补课 标准答案： B 解析：对患儿进行健康体检，采集健康史属于入院护理评估内容。 10、 接种脊髓灰质炎疫苗时，正确的是() A. 接种对象是新生儿 B.初种次数为1次 C. 用热水送服 D.需要复种加强 E.接种方法为肌肉注射 标准答案： D 解析：脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸需用冷开水送服或含服，服后1小时内禁饮热开水，初种年龄是2个月，初中次数是3次，间隔一个月，4岁时加强口服三型混合糖丸疫苗。

特别推荐：[#0000ff>2011年护士执业资格考试内容七大变化](#)
[#0000ff>2011年护士考试报名时间](#) [#0000ff>2011年护士考试报名流程](#) [#0000ff>2011年执业护士考试报名条件](#) 更多信息请访问：[#0000ff>护士考试辅导无忧通关班](#) [#0000ff>护士论坛](#)
[#0000ff>护士在线题库](#) [blue>护理学专业（护士）《相关专业](#)
[知识》全真模拟试汇总](#) 相关链接：[#0000ff>2011年儿科护理](#)

：小儿支气管肺炎的护理 #0000ff>2011护士资格考试《儿科护理学》常见考点归纳 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com