

2011年护士资格考试《妇产科护理学》课后习题(3) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E6_8A_A4_c21_3203.htm 护士考试必备！精选护士资格考试

妇产科护理学历年常考真题！一、单选题(单选题，每题只有一个正确答案，一共20题，每题5分。) 1、产后出血的原因不包括 A.宫缩乏力 B.软产道损伤 C.胎盘因素 D.凝血功能障碍 E.胎头不能入盆 标准答案：E 解析：产后出血的四大原因为 A 宫缩乏力 B 软产道损伤 C 胎盘因素 D 凝血功能障碍胎头不能入盆可导致产程延长及阴道分娩困难。 2、胎膜早破的护理不妥的是 A.孕妇卧床休息 B.每日测体温，监测白细胞及分类 C.每日用消毒液冲洗会阴 D.观察羊水性状、气味 E.破膜24小时仍未临产，给有效的抗生素预防感染 标准答案：E 解析：破膜12小时仍未临产，给有效的抗生素预防感染。 3、子宫收缩乏力性产后出血，可以采取的治疗措施错误的是 A.注射催产素 B.宫腔填塞纱布 C.结扎盆腔血管止血 D.按摩子宫 E.双手刺激耻骨联合上方 标准答案：E 解析：BCD均对。 4、晚期产后出血最常见原因是 A.胎盘残留 B.蜕膜残留 C.胎盘附着部位子宫复旧不好 D.子宫内膜炎 E.剖宫产切口裂开 标准答案：A 解析：以上都是晚期产后出血的常见原因，其中胎盘胎膜残留最常见。 5、关于子宫收缩乏力，错误的是 A.产妇精神紧张、恐惧是造成宫缩乏力的因素 B.宫缩规律，但收缩力弱，持续时间短为协调性宫缩乏力 C.高张性宫缩乏力可促使产程进展，胎先露下降 D.协调性子宫收缩乏力又称低张性宫缩乏力 E.产后应预防出血过多和感染 标准答案：C 解析：高张性宫缩乏力属无

效宫缩。可使产程延长或停滞，胎先露下降延缓或停滞。 6、胎膜早破常见于 A. 胎膜早破是指宫口开大2厘米时 B. 阴道检查时推动胎先露时阴道流液量增多 C. 孕妇突感有液体自阴道流出，并伴有腹痛下坠感 D. 胎儿未成熟已破膜24小时可急诊行剖宫产术 E. 保胎时如疑有脐带脱垂需终止妊娠时应用地塞米松促进胎肺成熟 标准答案： B 7、产后出血最常见原因是 A. 子宫收缩乏力 B. 胎盘滞留 C. 产道裂伤 D. 羊水栓塞 E. 凝血功能障碍 标准答案： A 8、足月临产产程顺利，胎儿胎盘娩出后阴道出血较多约500毫升，呈阵发性，血压80/60MMHG，心率110次/分，查软产道无损伤，刺激宫缩后出血量减少，应诊断为 A. 子宫乏力性产后出血 B. 软产道损伤产后出血 C. 凝血功能障碍性产后出血 D. 胎盘滞留性产后出血 E. 隐性产后出血 标准答案： A 9、27岁，宫内孕40周，胎儿胎盘娩出，胎膜部分残留，手取胎膜后子宫收缩好，于产后一周出现寒战.高热.体温达40度C以上，白细胞明显增多，恶露有臭味，查子宫底脐下3指明显压痛，可能为下列何种诊断 A. 急性输卵管炎 B. 急性盆腔结缔组织炎 C. 急性子宫内膜炎及子宫肌炎 D. 急性宫颈炎 E. 急性盆腔腹膜炎 标准答案： C 10、急产是指总产程不超过 A. 2小时 B. 3小时 C. 4小时 D. 6小时 E. 10小时 标准答案： B 特别推荐：#0000ff>2011年护士执业资格考试内容七大变化 #0000ff>2011年护士考试报名时间 #0000ff>2011年护士考试报名流程 #0000ff>2011年执业护士考试报名条件 更多信息请访问：#0000ff>护士考试辅导无忧通关班 #0000ff>护士论坛 #0000ff>护士在线题库 blue>护理学专业（护士）《相关专业知识》全真模拟试汇总 相关链接：#0000ff>2011年护士妇产科护理：异位妊娠手术治疗的护理

#0000ff>2011年护士妇产科护理：乙肝准妈妈的怀孕护理

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com