

2011年妇产科护理：高泌乳素血症合并妊娠的护理 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_A6_87_c21_3218.htm 高泌乳素血症合并妊娠的护理：了解病史、胎儿监护、心理护理、密切观察病情变化、观察患者的生命体征、产后子宫出血、伤口的护理、乳房的护理、健康教育！

1.分娩前的护理（1）了解病史 患者入院后了解用药史，病理机制，药物机制，指导合理用药，讲解用药反映，注意事项（不良反应）。（2）胎儿监护 因患者胎儿比较珍贵，予以胎心监护，吸氧，教其自数胎动。（3）心理护理 因患者结婚多年未孕，受孕后担心胎儿的发育情况，因此对其做好心理护理，多与患者交流，关爱，尊重患者，使其紧张焦虑的情绪减轻和稳定。（4）密切观察病情变化 患者曾做脑CT，提示垂体腺瘤不排除。出现视野缺损、垂体腺瘤是高泌乳素血症最常见的原因。因此，在妊娠期必须严密监测PRL，遵医嘱指导用药。患者于孕18周时PRL升高而继续口服溴隐亭至38周。

2.分娩后的护理（1）观察患者的生命体征 严密观察血压、心率、呼吸，无异常情况。至产后3天，患者血压趋于正常。（2）产后子宫出血、伤口的护理 术后给予催产素20U肌肉注射，促进子宫收缩，按压宫底，阴道出血约20ml.术后第2天观察伤口，无红肿及渗液、干燥，并给予换药并外阴冲洗Bid.（3）乳房的护理 溢乳是高泌乳素血症典型的临床表现。但患者孕期服用溴隐亭，溴隐亭能有效的抑制PRL的合成分泌。患者乳房有轻微胀痛，但无乳汁分泌，因患者孕期服用溴隐亭，不想喂奶故给予芒硝外敷，每日2次，每次500g，3天后回奶。（4）健康教育 患者产褥期使用

溴隐亭，注意避孕剂的影响。若需避孕，不宜使用雌激素避孕药。因大量雌激素可使垂体分泌素细胞增生，血清PRL值也会上升。 特别推荐：[#0000ff>2011年护士执业资格考试内容七大变化](#) [#0000ff>2011年执业护士考试题型](#) [#0000ff>2011年执业护士考试时间](#) [#0000ff>2011年执业护士资格考试大纲](#) 更多信息请访问：[#0000ff>2011护理专业辅导无忧通关班](#) 相关链接：[#0000ff>2011年妇产科辅导：妊娠期伴发脑梗死患者的心理护理](#) [#0000ff>2011年妇产科护理：气管切开术后口腔和切口护理](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com