

2011年儿科护理：六种情况宝宝千万别洗澡 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_3303.htm 六种情况100test千万别洗澡：打预防

针后暂时不要洗澡。遇有频繁呕吐、腹泻时暂时不要洗澡。发热或热退48小时以内不建议洗澡。当100test发生皮肤损害时不宜洗澡。喂奶后不应马上洗澡。低体重儿要慎重洗澡。

100test的清洁很重要，但是一下六种情况下，最好不要

给100test洗澡，以免影响100test的身体健康。1、打预防针后暂时不要洗澡。100test打过预防针后，皮肤上会暂时留有肉眼难见的针孔，这时洗澡容易使针孔受到污染。2、遇有频繁

呕吐、腹泻时暂时不要洗澡。洗澡时难免搬动100test，这样会使呕吐加剧，不注意时还会造成呕吐物误吸。3、发热或热退48小时以内不建议洗澡。给发热的100test洗澡，很容易使100test出现

寒战，甚至有的还会发生惊厥；不恰当的洗澡有时会使皮肤毛孔关闭导致体温更高，有时又会使全身皮肤毛细血管扩张充血，致使100test身体的主要脏器供血不足。

另外，发热后100test的抵抗力极差，马上洗澡很容易遭受风寒引起再次发热，故主张热退48小时后才给100test洗澡。4、当100test发生皮肤损害时不宜洗澡。100test有皮肤损害，诸如脓疱疮、疖肿、烫伤、外伤等，这时不宜洗澡。因为皮肤损害的局部会有创面，洗澡会使创面扩散或受污染。5、喂奶后不应马上洗澡。喂奶后马上洗澡，会使较多的血液流向被热水刺激后扩张的表皮血管，而腹腔血液供应相对减少，这样会影响100test的消化功能。其次由于喂奶后100test的胃呈扩张状态，马上洗澡也容易引起呕吐。所以洗澡通常应在喂

奶后1~2小时进行为宜。6、低体重儿要慎重洗澡。低体重儿通常指出生体重小于2500克的100test。这类100test大多为早产儿，由于发育不成熟，生活能力低下，皮下脂肪薄，体温调节功能差，很容易受环境温度的变化出现体温波动。所以对这类特殊的100test要慎重决定是否给以洗澡。决定是否给100test洗澡除了100test本身的因素外，还受到周围环境的限制。给100test洗澡时的环境温度以26~28 为宜，水温在40~42 。

特别推荐：[#0000ff>2011年护士执业资格考试内容七大变化](#) [#0000ff>2011年护士证考试时间](#) [#0000ff>2011年执业护士考试时间和科目](#) [#0000ff>2011年护士执业资格考试准考证打印时间](#) 更多信息请访问：[#0000ff>护士考试辅导无忧通关班](#) [#0000ff>护士论坛](#) [#0000ff>护士在线题库](#) [blue>护理学专业（护士）《相关专业知识》全真模拟试汇总](#) 相关推荐：[#0000ff>2011年儿科护理：小儿支气管肺炎护理要点](#) [#0000ff>2011年儿科护理：小儿患急性化脓性中耳炎的护理](#)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com