

2011年外科护理：胆囊切除术术后护理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_A4_96_c21_3359.htm 胆囊切除术术后护理：术后平卧、

腹胀、呕吐不严重，术后次日可开始进不胀气流质饮食，并逐步增加饮食量、继续应用青、链霉素等！ 1.术后平卧。无

休克者次日改半坐位。 2.腹胀、呕吐不严重，术后次日可开始进不胀气流质饮食，并逐步增加饮食量。有严重腹胀肠麻

痹者，术后继续禁食1~2日，必要时作胃肠减压。服用中药胃肠复元汤，每日一剂，分两次服，可促进肠蠕动早期恢复。

禁食期间应静脉输液。 3.继续应用青、链霉素，或根据胆汁细菌培养敏感度测定结果选用抗生素。 4.有黄疸者，继续

用大量维生素b1、c、k及高渗葡萄糖等保肝药物。 5.香烟引流一般于术后2~3日拔除。 特别推荐：[#0000ff>2011年护士执业资格考试内容七大变化](#) [#0000ff>2011年执业护士考试题型](#)

[#0000ff>2011年执业护士考试时间](#) [#0000ff>2011年执业护士资格考试大纲](#) 更多信息请访问：[#0000ff>2011护理专业辅导无忧](#)

[#0000ff>2011年执业护士资格考试大纲](#) 更多信息请访问：[#0000ff>2011护理专业辅导无忧](#) 通关班 相关链接：[#0000ff>2011年外科护理：昏迷的护理措施](#)

[#0000ff>2011年外科护理：运动障碍的护理](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com