

2011年初级护师辅导：典型麻疹分期 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_88_9D_c21_3401.htm

典型麻疹分期：潜伏期、前驱期、出疹期、恢复期！典型麻疹分期是护士/护师/主管护师考试经常考到的知识点，百考试题初级护士站搜集整理典型麻疹分期，现总结如下：1.潜伏期 一般为10~14天，亦有短至1周左右。在潜伏期内可有轻度体温上升。2.前驱期 也称发疹前期，一般为3~4天。这一期的主要表现类似上呼吸道感染症状：发热，见于所有病例，多为中度以上发热；咳嗽、流涕、流泪、咽部充血等卡他症状，以眼症状突出，结膜发炎、眼睑水肿、眼泪增多、畏光、下眼睑边缘有一条明显充血横线（Stimson线），对诊断麻疹极有帮助。Koplik斑，在发疹前24~48小时出现，为直径约1.0mm灰白色小点，外有红色晕圈，开始仅见于对着下臼齿的颊粘膜上，但在一天内很快增多，可累及整个颊粘膜并蔓延至唇部粘膜，粘膜疹在皮疹出现后即逐渐消失可留有暗红色小点；偶见皮肤荨麻疹，隐约斑疹或猩红热样皮疹，在出现典型皮疹时消失；部分病例可有一些非特异症状，如全身不适、食欲减退、精神不振等。婴儿可有消化系统症状。幼儿常有呕吐、腹泻，在软腭、硬腭弓出现红色细小内疹。第2~3日可于双侧近臼齿颊粘膜处出现细砂样灰白色小点，绕以红晕，称麻疹粘膜斑，为本病早期特征，也可见于下唇内侧及牙龈粘膜，偶见于上腭，一般维持16~18小时，有时1~2日，多于出疹后1~2日内消失。3.出疹期 多在发热后3~4天出现皮疹。体温可突然升高至40~40.5℃，皮疹开始为稀疏不规则的红色斑丘疹

，疹间皮肤正常，始见于耳后、颈部、沿着发际边缘，24小时内向下发展，遍及面部、躯干及上肢，第3天皮疹累及下肢及足部，病情严重者皮疹常融合，皮肤水肿，面部浮肿变形。大部分皮疹压之褪色，但亦有出现瘀点者。全身有淋巴结肿大和脾肿大，并持续几周，肠系膜淋巴结肿可引起腹痛、腹泻和呕吐。阑尾粘膜的麻疹病理改变可引起阑尾炎症状。疾病极期特别是高热时常有谵妄、激惹及嗜睡状态，多为一过性，热退后消失，与以后中枢神经系统合并症无关。此期肺部有湿性罗音，X线检查可见肺纹理增多。4.恢复期 出疹3~4天后皮疹开始消退，消退顺序与出疹时相同；在无合并症发生的情况下，食欲、精神等其他症状也随之好转。疹退后，皮肤留有糠麸状脱屑及棕色色素沉着，7~10天痊愈。特别

推荐：[#0000ff>2011年护士执业资格考试内容七大变化](#)

[#0000ff>2011年执业护士考试题型](#) [#0000ff>2011年执业护士考](#)

[试时间](#) [#0000ff>2011年执业护士资格考试大纲](#) 更多信息请访

问：[#0000ff>2011护理专业辅导无忧通关班](#) 相关链接：

[#0000ff>2011年初级护师辅导：透析性低血压的症状](#)

[#0000ff>2011年初级护师辅导：佩普劳的护患关系四期](#) 欢迎进

入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访

问 www.100test.com