

2011年手术室护理：断肢再植手术后护理 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E6_89_8B_c21_3409.htm

断肢再植手术后护理包括：一般护理，病情观察，预防感染，用药护理，功能锻炼。（1）一般护理：1）了解手术情况：骨折固定，肌腱、血管、神经修复情况，手术是否顺利。2）手术后卧床2~3周，适当限制活动。（2）病情观察：www.Examda.CoM 1）全身观察：注意生命体征变化及尿量，并记录24小时液体出入量。2）再植肢体观察：制动及抬高患肢适当限制活动，抬高患肢至略高于心脏水平，利于静脉回流，但不宜过高以免影响血供。局部皮温测量手术后10日内，每1~2小时测量1次，并记录，如皮温突然下降3℃以上，提示静脉栓塞，测量时注意在同一部位。观察再植肢体的颜色、肿胀、毛细血管回流情况。皮肤由红润变苍白、皮温降低、指腹塌陷、毛细血管充盈时间延长超过2秒、动脉搏动减弱或消失，提示动脉痉挛或栓塞，即动脉危象。若皮色暗紫、皮温下降、指腹肿胀及毛细血管充盈时间缩短（<1秒）、动脉搏动存在提示静脉回流受阻，即静脉危象。如肢体肿胀应定位定时测量肢体周径，以便观察对比。其中肢体肿胀和毛细血管充盈时间很少受外界因素干扰，可以更准确地反应肢体血供情况，要求手术后3日内每小时观察1次。血管危象易发于手术后72小时内，一旦发生立即通知医生及时处理。（3）预防感染：手术后病人住单人病房，定时消毒，手术后1~2周内要求室温在20~25℃，湿度50%~60%，专人护理，限制探视。肌注抗生素预防感染，减少静脉给药，防止静脉炎及血栓发生。（4）

用药护理：遵医嘱及时应用抗凝剂及血管扩张药，同时应用镇静止痛剂，以减轻疼痛。（5）功能锻炼：手术后功能锻炼遵循循序渐进和主动锻炼为主的原则。手术后3周内为软组织愈合期，护理重点是预防感染，可进行理疗、按摩，以改善血行及消除肿胀。手术后4~6周开始为无负荷功能锻炼期。此期骨折愈合不牢，只做患肢屈伸、握拳活动以防止关节僵直、肌肉萎缩和粘连。手术后6~8周，骨折已愈合，护理重点时促进神经功能恢复和瘢痕软化为主，加强患肢活动和感觉训练，同时可配合理疗及药物治疗。特别推荐：

#0000ff>2011年护士资格证考试报名流程 #0000ff>2011年护士资格证考试报名条件 #0000ff>2011年护士资格证考试报名时间
更多信息请访问：[#0000ff>护士考试辅导无忧通关班超值优惠价300元/人](#) #0000ff>护士论坛 #0000ff>护士在线题库 blue>护理学专业（护士）《相关专业知识》全真模拟试汇总 相关推荐：
：[#0000ff>2011年手术室护理：断肢再植手术前护理](#) 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com