

2011年手术室护理：硬脊膜外阻滞护理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E6_89_8B_c21_3411.htm 硬脊膜外阻滞护理包括：一般护理与常见并发症的护理。

1.一般护理（1）硬膜外麻醉穿刺时不穿透蛛网膜，不会引起头痛，但因交感神经阻滞，血压多受影响，故术后需要平卧4~6小时，但不必去枕，麻醉后血压、脉搏平稳后即可按手术本身需要采取适当卧位。（2）监测生命体征直到平稳；吸氧；防止麻醉后并发症的出现。

#ffffff>百考试题(www.100test.com) 2.常见并发症的护理

（1）全脊麻：全部脊神经受阻滞称全脊麻，是硬膜外麻醉最危险的并发症。系硬膜外阻滞时穿刺针或导管误入蛛网膜下腔而未及时发现，并将超量局麻药注入蛛网膜下腔而产生异常广泛的阻滞。临床主要表现为注药后迅速出现低血压、意识丧失、呼吸、循环停止，全部脊神经支配区域无痛觉。

（2）其他：穿刺部位感染、导管折断、血肿等。特别推荐：
#0000ff>2011年护士资格证考试报名流程 #0000ff>2011年护士资格证考试报名条件 #0000ff>2011年护士资格证考试报名时间 更多信息请访问：
#0000ff>护士考试辅导无忧通关班超值优惠价300元/人 #0000ff>护士论坛 #0000ff>护士在线题库 blue>护理学专业（护士）《相关专业知识》全真模拟试汇总 相关推荐：
#0000ff>2011年手术室护理：蛛网膜下腔阻滞护理 #0000ff>2011年手术室护理：断肢再植手术前护理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com