

2011年内科护理：碘过敏试验法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_3703.htm 碘过敏试验法包括：试验方法，结果判断。碘过敏试验法临床上常用碘化物做造影剂进行心血管、脑血管、肾脏、胆囊、支气管及X线摄片检查，因碘可引起过敏反应，故用药前1~2日须做过敏试验。

1 试验方法

1. 口服法：口服5~10%碘化钾（或碘化钠）10ml Tid 连服三天。
2. 皮内注射法：取碘造影剂0.1ml做皮内试验，20分钟后观察结果。
3. 眼结膜试验：取碘造影剂1~2滴滴入一侧眼内，5~10分钟后，对照观察双眼。
4. 舌下试验：取碘造影剂2~3滴滴于舌下，5~10分钟后观察结果。
5. 静脉注射试验：取碘造影剂1ml（30%泛影葡胺）静脉推注，5~10分钟后观察反应结果。但须先皮内试验阴性后，再静脉推注，两者均阴性后，方可造影。

2 结果判断

1. 口服：有口麻、头晕、心慌、恶心、呕吐、荨麻疹等症状为阳性。
2. 皮内注射：局部有红肿硬结，直径100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com