

2011年基础护理：皮内注射标准操作 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_9F_BA_c21_3718.htm

皮内注射标准操作：目的，准备质量标准，操作流程质量标准，终末质量标准。（一）目的 1、作各种药物过敏试验，以观察局部反应。2、预防接种。3、用于局部麻醉的先驱步骤。（二）准备质量标准 1、着装整洁。洗手戴口罩。2、用物准备：治疗盘内盛：无菌注射器（1毫升）及针头（4-5号）、无菌持物钳、75%酒精、棉签、弯盘、纱布、药物、污物缸、急救药盒（注射器1副，肾上腺素1支，砂轮1个）。3、稀释好皮试药物。（三）操作流程质量标准 1、携用物至床旁，对床号、姓名，向病员解释，询问过敏史，以取得合作。2、吸药：用酒精棉签消毒瓶塞，待干。往瓶内注入和所需药液等量的空气，倒转药瓶与注射器，使针头在液面以下，左手食、拇指握住瓶颈，中、无名指和小指与大鱼际肌握住针筒，右手拇指、食指和中指持注射器活塞柄，吸药液至所需量，再以右手食指固定针栓，拔出针头。3、消毒皮肤：左手食指夹住注射器，拇、中和无名指揭开棉签缸盖，右手持镊取一棉签蘸酒精消毒前臂掌侧皮肤（直径大于5厘米）。4、排气：将针头垂直向上，轻拉活塞使针头药液流入注射器内，并使气泡聚集在乳头口，左手拇指固定针栓，右手稍推活塞，驱出气体。5、左手在前臂背侧绷紧皮肤，右手持注射器，使针头斜面在上，和皮肤呈5度角刺入皮内，待针头斜面进入皮内后，放平注射器，左手拇指固定针栓，注入药液0.1毫升。6、注射完毕，迅速拔出针头，切勿按压。7、清理用物，归还原处。20分钟

后观察结果。（四）终末质量标准 1、操作熟练，坚持三查七对，皮试液剂量准确。一次注射成功。2、口述结果判断及对照试验法。3、口述过敏反应的应急处理措施。（五）注意事项 1、皮试前详细询问有无过敏史，如对所需注射药物有过敏者不可做过敏试验。2、配制皮试药液必须用生理盐水，用于不同药物的注射器及针头禁止交叉使用。3、皮试后观察时间不能少于20分钟，阳性者禁用，并在医嘱单或门诊病历上注明过敏。4、青霉素皮试液要求现配现用。（六）皮试结果判断 阴性：皮试20分钟后皮丘消失或无红肿，全身也无反应。阳性：局部皮肤出现红晕，硬块，皮丘直径大于1cm，也可出现荨麻疹。强阳性：试验处皮肤出现明显突起的风团或大丘疹，周围充血或不充血，部分病人伴有痒、麻、热等感觉或全身反应，个别青霉素病人可出现过敏性休克。特别推荐：[#0000ff>2011年执业护士资格考试考后真题与答案](#) [#0000ff>2011年执业护士资格考试成绩查询](#) [#0000ff>2012年执业护士考试介绍](#) 更多信息请访问：[#0000ff>护士考试辅导无忧通关班](#) [#0000ff>护士论坛](#) [#0000ff>护士在线题库](#) 相关推荐：[#0000ff>2011年基础护理：预防护理便秘的方法](#) [#0000ff>2011年基础护理：功能性老年便秘的护理要点](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com