

妊娠急性脂肪肝肾衰竭的护理-护士资格考试- PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022__E5_A6_8A_E5_A8_A0_E6_80_A5_E6_c21_3828.htm 妊娠急性脂肪肝肾衰竭的

护理：护理人员必须严格记录尿量，剖宫产术后留置尿管，发现尿少、尿闭、血红蛋白尿，应报告医生并及时处理，还应观察病人水肿情况，高血钾体征及电解质平衡，控制液体滴速。AFLP因肝功能衰竭，肾素-血管紧张素等血管活性物质灭活功能障碍，而使肾血管持续收缩，导致肾皮质缺血与肾小球过滤下降。进而发展为功能性肾衰竭，持续的肾缺血，又会引起急性肾小管坏死。而导致器质性肾衰。尿量是反应肾灌注情况的重要指标，也是休克时最敏感的监测指标，护理人员必须严格记录尿量，剖宫产术后留置尿管，发现尿少、尿闭、血红蛋白尿，应报告医生并及时处理，还应观察病人水肿情况，高血钾体征及电解质平衡，控制液体滴速。

特别推荐：[#0000ff>2011年执业护士资格考试成绩查询](#)

[#0000ff>2011年执业护士资格考试考后真题与答案](#)

[#0000ff>2012年执业护士考试介绍](#) 更多信息请访问：[#0000ff>](#)

[护士考试辅导无忧通关班](#) [#0000ff>护士论坛](#) [#0000ff>护士在线](#)

[题库](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com