

2012年外科护理：手舟状骨骨折诊断 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_A4_96_c21_3840.htm 手舟状骨骨折诊断：跌倒时，手呈腕关节背伸位支撑着地，伤后腕桡侧肿痛，腕关节活动受限。手舟状骨骨折诊断：跌倒时，手呈腕关节背伸位支撑着地，伤后腕桡侧肿痛，腕关节活动受限。检查时，发现鼻烟窝外肿胀及压痛，腕活动时疼痛加剧，上述表现应疑有舟状骨骨折，最后以X线确诊。腕关节正侧位片时，舟状骨不能全部被显露，加以骨折早期骨折线不清晰，不易被发觉。因此凡在临床上疑有舟状骨骨折病例，即使急诊时X线检查无骨折表现，也应按骨折处理，并于2周后重复X线检查，并强调拍摄舟状骨轴心片，有时需在伤后4~6周才能在X线上显示骨折表现。 特别推荐：>2011年执业护士资格考试成绩查询 >2011年执业护士资格考试考后真题与答案 >2012年执业护士考试介绍 更多信息请访问：>护士考试辅导无忧通关班 >护士论坛 >护士在线题库 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com