

2011年手术室护理：复发性嵌甲成形术及护理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E6_89_8B_c21_3855.htm

复发性嵌甲成形术及护理包括：心理护理，换药，健康宣教。

- 1.心理护理 做好换药前的心理护理，嘱患者换药前30min口服止痛片，换药时和患者交谈沟通以分散患者的注意力，理解患者的疼痛并给予鼓励。
- 2.换药 拔甲后换药方法相当重要，第1次换药术后3天，换药时轻轻揭开创面上的凡士林纱布，消毒后0.1%雷弗诺尔纱条填塞于甲侧皱襞的V型沟内，略加压包扎，防止肉芽组织将V型沟填满而影响趾甲正常生长致使嵌甲复发。第二次换药间隔3天，用生理盐水浸湿抗菌纱条并缓慢揭去，减少疼痛和出血，消毒并拆除缝线，再用抗菌纱条填塞伤口，以保持甲床的宽度。以后每3天左右换药1次，大约3~4星期伤口愈合。
- 3.健康宣教（1）穿鞋选择大小肥瘦适当、合适轻便的鞋。（2）勤剪脚趾甲，但不宜过短，剪成弧形，甲沟两侧不留趾甲尖，不随便剪甲沟。（3）养成良好的卫生习惯，不要随意拔除倒刺，一旦出现倒刺要用剪刀剪，切忌硬性拔出。（4）约15%患者直接或间接与甲癣有关，故应及时治疗。特别推荐

：#0000ff>2011年执业护士资格考试考后真题与答案

#0000ff>2011年执业护士资格考试成绩查询 #0000ff>2012年执业

护士考试介绍 更多信息请访问：#0000ff>护士考试辅导无

忧通关班 #0000ff>护士论坛 #0000ff>护士在线题库 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com