

2012年内科护理：低血糖的紧急护理措施 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_3971.htm

低血糖的紧急护理措施：进食含糖食物，补充葡萄糖。低血糖的紧急护理措施包括： 进食含糖

食物：大多数低血糖病人通过进食含糖食物后15分钟内可很快缓解，含糖食物可为2~4块糖果或方糖，5~6块饼干，一匙蜂蜜，半杯果汁或含糖饮料等。

补充葡萄糖：静脉推注50%葡萄糖40~60ml是紧急处理低血糖最常用和有效的方法。

胰高血糖素及1mg肌注，适用于一时难以建立静脉通道的

院外急救或病人自救。特别推荐：[#0000ff>2011年护士资格证](#)

[成绩查询时间](#) [#0000ff>2011年护士资格证分数线](#) [#0000ff>2012](#)

[年执业护士考试介绍](#) 更多信息请访问：[#0000ff>护士考试辅](#)

[导无忧通关班](#) [#0000ff>护士论坛](#) [#0000ff>护士在线题库](#) 相关推

荐：[#0000ff>2012年内科护理：酮症酸中毒紧急护理措施](#)

[#0000ff>2012年内科护理：类风湿关节炎的护理](#) 100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com