

2012年外科护理：造成骨折的间接原因 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_A4_96_c21_3984.htm 造成骨折的间接原因：年龄，性别，职业，疾病。

造成骨折的间接原因：1.年龄 幼儿行走不稳，易跌倒，易发生前臂及锁骨骨折，多为青枝骨折。18岁以下青年因骨骺未闭合，易发生骨骺分离。老年人因骨质萎缩或退化，骨质疏松，易发生股骨颈与肱骨颈骨折。2.性别 幼儿骨折性别无差异，中青年时男性骨折率较女性多7~10倍，老年时女性的骨折率又稍高于男性。3.职业 部队指战员，工矿、交通、建筑、体育工作者骨折机会多。4.疾病 全身或局部疾病可使骨质脱钙、疏松或破坏，如受轻度外伤，即可发生病理性骨折，如脆骨病、佝偻病、骨结核、骨肿瘤、化脓性骨髓炎。另外老年人股骨颈骨折都有不同程度骨质疏松，国外占11%。特别推荐：>2011年护士资格证成绩查询时间 >2011年护士资格证分数线 >2012年执业护士考试介绍 更多信息请访问：>护士考试辅导无忧通关班 >护士论坛 >护士在线题库 相关推荐：>2011年外科护理：骨折的各种分类 >2011年外科护理：在治疗期间如何护理股骨头坏死 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com