

非特异性外阴炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/302/2021_2022__E9_9D_9E_E7_89_B9_E5_BC_82_E6_c22_302377.htm 名称非特异性外阴炎
所属科室妇科病因分泌物增多，如宫颈、的炎性白带，宫颈癌的分泌物，经血或产后恶露的刺激均可引起不同程度的外阴炎。其他如月经垫、尿瘘患者的尿液浸渍，粪瘘的粪便刺激、糖尿病的糖尿刺激以及化学及物理性的刺激等也可引起外阴炎。常为混合性细菌感染，如葡萄球菌、大肠杆菌、链球菌等。临床表现炎症多发生于小阴唇内外侧，严重时整个外阴受累。外阴肿胀、充血，重者有糜烂，成片的湿疹，甚至有溃疡形成。外阴有灼热感，搔痒或疼痛，排尿时症状加重。慢性炎症时皮肤增厚、粗糙，可有皲裂，伴搔痒。诊断根据病史及临床表现，不难诊断，但需常规检查***分泌物有无滴虫、霉菌等。必要时查尿糖。年轻患者查大便有无蛲虫卵。治疗保持外阴清洁、干燥，避免搔抓。停用擦洗外阴的药物，不穿化纤内裤。急性期注重休息，禁性生活。必要时给磺胺药物或抗生素。应予病因治疗，治疗外阴炎、宫颈炎、糖尿病，修补瘘管。局部治疗可用1：5000高锰酸钾液坐盆，每日2~3次。外阴擦干后，局部用抗生素软膏或可的松油膏。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com