

单纯性外阴炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/302/2021_2022__E5_8D_95_E7_BA_AF_E6_80_A7_E5_c22_302425.htm 名称单纯性外阴炎

所属科室妇科病因主要由于不注重外阴卫生而受到下列因素的刺激：（一）分泌物刺激：由于分泌物增多或经血、月经垫刺激，非凡是宫颈炎及各种炎时，分泌物增多，流至外阴，均可产生不同程度的外阴炎。（二）其他刺激因素：如糖尿病患者的含糖尿液直接刺激：尿屡患者长期受尿液浸渍；粪瘘患者当腹泻、便秘时受粪便刺激；肠道蛲虫。（三）混合性感染：由于多方面的刺激，常引起混合性感染，致病菌常为葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌。临床表现急性期可见外阴肿胀、充血、糜烂，有时形成溃疡或成片的湿疹。患者自觉外阴部灼热、瘙痒或疼痛，排尿时尤甚。严重者腹股沟淋巴结肿大，压痛，体温可稍升高，白细胞增多。糖尿病性外阴炎，外阴皮肤发红、变厚，常呈棕色，有抓痕。由于尿糖有利于霉菌生长繁殖，故常并发白色念珠菌感染。慢性炎症时外阴瘙痒，呈苔藓化。诊断（一）具体询问病史，分泌物多少、性状，有无非凡因素。对老年患者要注重有无糖尿病病史；对年轻者注重有无蛲虫。注重了解患者的卫生习惯。（二）检查分泌物有无非凡感染，如霉菌、滴虫、阿米巴等。（三）必要时查尿糖，查大便虫卵。治疗（一）病因治疗：首先应针对原因进行治疗，除去病因，如治疗糖尿病、肠道蛲虫、进行瘘管修补、治疗宫颈炎及各种原因的***炎。急性期应少活动，较重者应卧床休息。注重营养，增强反抗力，必要时，针对致病菌口服或肌注抗生素。（二）局部治疗：1/5000高锰酸钾液坐浴，涂布紫草油或抗生素软

膏，如四环素或金霉素软膏等。100Test 下载频道开通，各类
考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com