

Shy-Drager综合征 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/302/2021_2022_Shy-Drager_c22_302537.htm 名称Shy-Drager综合征所属科室神经内科临床表现 中年后起病，男性多见。首先症状为阳萎。尿频、尿急、尿失禁等膀胱症状也出现早。相当长时间后出现本病的特征性症状--体位性低血压。病人取竖立位时头重脚轻，甚至昏厥。从卧位竖立后血压降低而心率不代偿性增快。尚可有严重便秘、无汗等其他植物神经症状。起病5年内遂渐出现基底节、小脑和 / 或锥体束的症状，如动作减少、强直、步态不稳等。病情持续进展，通常在起病后5~15年严重残疾或死亡。诊断 测卧位血压、心率5分钟后改竖立位，若收缩压降低4kpa (30mmHg)、舒张压降低2.67kPa (20mmHg) 以上持续3分钟而心率不加速，可确诊体位性低血压。有其他植物神经症状和脑症状，可诊断本病。震颤麻痹病人也可有中度体位性低血压，可出汗增多而非无汗，神经症状先于体位性低血压，无小脑损害。糖尿病、慢性酒精中毒、血卟啉病、Guillain-Barré.阻断剂普萘洛尔(心得安)或拟交感剂麻黄碱使体位性低血压进步的。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com