

智齿冠周炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/302/2021_2022__E6_99_BA_E9_BD_BF_E5_86_A0_E5_c22_302883.htm 名称智齿冠周炎所属科室口腔科临床表现 急性智齿冠周炎的主要症状为牙冠四周软组织肿胀疼痛。如炎症影响咀嚼肌，可引起不同程度的张口受限，如波及咽侧则出现吞咽疼痛,导致病员咀嚼、进食及吞咽困难。病情重者尚可有周身不适、头痛、体温上升、食欲减退等全身症状。检查可见下颌第三磨牙萌出不全、有龈瓣覆盖、盲袋形成。牙冠四周软组织红肿、龈瓣边缘糜烂、盲袋内有脓性分泌物。有时可形成冠周脓肿，出现颌面肿胀，同侧颌下淋巴肿大，压痛。急性冠周炎如未能彻底治疗，则可转为慢性，以后反复发作，甚至遗留瘻管。若炎症继续扩展，可发生下述各种并发症。例如蔓延至骨膜下形成骨膜下脓肿；或脓液沿下颌骨外侧骨面向前流注，可在相当于下颌第一或第二磨牙颊侧形成脓肿或龈瘻；也可向外扩展，形成颊部皮下脓肿，或穿破皮肤形成皮瘻。在临床上可见有颊部皮瘻的患者，应考虑有冠周炎的可能，防止误诊。冠周炎严重者，尚可并发颌周蜂窝织炎、下颌骨骨髓炎甚至全身性的感染。治疗 智齿冠周炎的治疗主要是增强病员机体抵抗力，控制感染，促使炎症消散。急性期过后，应考虑对病源牙采用外科治疗，以防复发。

1. 全身治疗 根据病情选用抗菌物或内服清热、解毒的中草药进行治疗。
2. 局部治疗 智齿冠周炎的局部治疗很重要。每日可用1 - 3%过氧化氢溶液及生理盐水或其他灭菌溶液冲洗盲袋，然后点入3%碘甘油。另给复方硼砂液或呋喃西林液等含漱，一日多次。早期还可局部理疗、外敷中草药以助炎症吸收。针刺疗法可有镇痛、

改善张口等作用。如脓腔形成，可切开引流。3. 病源牙处理 急性炎症消退后，应对病源牙作进一步处理，以防复发。如牙位正、能正常萌出，并有对颌牙行使咀嚼功能者，可作冠周龈瓣楔形切除术。否则应予拔除。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com