

牙周病 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/302/2021_2022__E7_89_99_E5_91_A8_E7_97_85_c22_302894.htm 名称牙周病所属科室口腔科
病因 牙周病的主要原因是牙菌斑，简单地说就是口腔卫生不良所引起的破坏。牙菌斑的主要成份是细菌，并交杂着一些口内已脱落细胞及一些有机物，但不是一般大块的食物残渣。牙菌斑通常肉眼难见，必须使用牙菌斑染色剂才能显示。假如任凭牙菌斑滋长，则会看到牙齿表面堆积着一层黄白色略呈颗粒状的东西，这就是一层很厚的牙菌斑。临床表现
1. 牙周病常开始于牙龈炎，牙龈肿胀、变红、出血，正常外形改变，韶缘糜烂或增生，咀嚼食物或刷牙时轻易出血。2. 龈沟加深继而形成龈袋，而牙周袋形成导致牙龈在牙面上的附着丧失，一般无症状，有感染时可发生并波及整个牙周袋壁，可有疼痛、溢脓、口臭等症状。依据x线显示，可见牙槽嵴顶的硬骨板消失，边缘如虫蚀状，继而牙槽嵴发生垂直吸收，高度降低。3. 牙周组织的损害到达一定程度，支持骨减少，加之咬验创伤加重，导致牙齿松动。诊断
1. 牙龈红肿触痛或牙龈退缩，刷牙或进食时出血。2. 牙周袋形成、溢脓。3. 牙齿松动、移位。4. 牙槽骨吸收、高度降低、骨小梁减少或消失。治疗
1. 局部治疗 (1) 洁治：控制菌斑，去除局部刺激物，用洁刮术去除牙石。(2) 药物：牙周袋及根面药物处理，刮除龈下牙石后，对内壁的病理性肉芽用探针蘸腐蚀性药物(如碘酚)进入牙周袋达到治疗效果。(3) 手术：手术清除牙周袋，牙周袋不深者可将牙周袋切除，深牙周袋可采用内壁刮除术、切除新附着术、翻瓣术等。(4) 固定松牙，形成牙周夹板，注重控制菌魔，拔除不能保留的病牙。2.

全身治疗：选用促使牙周组织修复及辅助改善炎症的药物，如牙周宁、中药固齿剂、维生素类药、灭滴灵、螺旋霉素等。预防及预后 1. 注重口腔卫生、彻底去除牙石及不良修复体、充填体等刺激物。 2. 加强锻炼，提高健康水平，积极治疗全身性疾病。 3. 叩齿、早晚按摩牙龈。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com