

滴虫病 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/302/2021_2022__E6_BB_B4_E8_99_AB_E7_97_85_c22_302939.htm 名称滴虫病所属科室传染科病因

滴虫病 (trichomoniasis) 是由人肠滴虫

(trichomonas hominis) 和***滴虫 (T.vaginalis) 等所致的原虫寄生虫病。滴虫的生活史较简单，仅有滋养体，以二分裂法增殖。通过直接和间接方法传播临床表现 肠滴虫病的症状为腹泻、腹痛及便秘。粪便中有大量滴虫，可服喹碘仿，成人剂量250mg，每日1次，连服5日。小儿酌减。诊断 滴虫寄生在女孩的***和尿道内，也可寄生于男孩的泌尿生殖器官内，引起滴虫性***炎或尿道炎。滴虫性***炎常见症状为外阴瘙痒与白带增多。白带可呈白色、赤色、沫状，脓状或水状，常以泡沫状为典型。***粘膜出血可引起赤带，有化脓性细菌同时存在可呈脓带。滴虫性尿道炎可有尿痛、尿频等症状。粪便或***分泌物找到活动的滴虫可确诊。治疗 治疗常用口服药有灭滴灵，剂量参阅上述quot.治疗项。如为滴虫性***炎，可用1 4000高锰酸钾溶液局部冲洗。口服灭滴灵，小儿只限于体重45kg以上的女孩，年幼者只用局部制剂。成人剂量每次0.2g，每日3次，7~10日为一疗程。小儿酌减。近用灭滴栓（从桃汁制成的栓剂，其主要成分为扁桃酸酰胺及苯甲酸）治疗***炎，每日1次，其优点为无副作用，而灭滴灵则副作用较大，为避免自己感染，应将污染衣裤煮沸消毒。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com