

玻璃体混浊 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/302/2021_2022__E7_8E_BB_E7_92_83_E4_BD_93_E6_c22_302977.htm 名称玻璃体混浊所属科室眼科病因 先天残留于玻璃体内的胚胎细胞或组织、视网膜或葡萄膜的出血侵入玻璃体内，高血压、糖尿病、葡萄膜炎的出血或渗出物侵入玻璃体内，老年人高度近视眼的玻璃体变性，均可导致玻璃体液化而混浊。其他如眼外伤、眼内异物存久留、寄生虫或肿瘤等也可发生玻璃体混浊。临床表现 1.轻度病人自觉眼前黑影飘动，就如蚊蝇飞舞。起病忽然，病情发展较快。随着玻璃体混浊的部位和程度的不同而影响视力的程度也不一样。轻度混浊不影响视力，用检眼镜检查也不能发现。 2.较显著的混浊，常见于变性性近视，葡萄膜炎和玻璃体积血。病人感到眼前粗大而量多的黑影，视力有不同程度的减退。检查眼底可发现如灰尘或粗条絮索块状飘浮不定，严重者不能窥见眼底，甚至眼底无红光反射。漆黑一片。诊断 1.症状 发病忽然，常有反复。眼前出现烟柱式或黑云状暗影，有的很快失明，仅留光感。 2.体征 裂隙灯下见玻璃体内有鲜红色血块，或棕黄色陈旧出血。 检眼镜下见尘状、条状及块状混浊飘浮，或仅见稀微红光，或无红光。 反复出血者，玻璃体内可见增殖性条索或膜，伴有新生血管。治疗 生理性飞蚊症无需治疗。病理性混浊要针对原发病进行治疗。新鲜的玻璃体积血应卧床休息，应用止血药物。陈旧性出血者，应用促进混浊吸收的药物，如狄奥宁眼药水滴眼，口服维生素C、他巴唑等；肌注安妥碘或透明质酸酶。严重病例一般治疗无效者，可采用玻璃体切除术。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访

