

并发性和后发性白内障 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E5_B9_B6_E5_8F_91_E6_80_A7_E5_c22_303073.htm 名称并发性和后发性
白内障所属科室眼科病因 并发性白内障（complicated cataract）
并发性白内障是由于眼部其它疾病如葡萄膜炎、青光眼、
视网膜脱离、视网膜色素变性、眼内肿瘤和高度近视等影响
晶体的营养和代谢而引起的晶体混浊。后发性白内障特指在
白内障摘除术后残留的晶体上皮增生以及由其他组织转化来的
细胞增生的混浊或机化膜，位于瞳孔中心可影响视力。临床
表现 并发性白内障的临床表现典型的混浊最早发生在晶体
囊膜下。由眼前节炎症形成的虹膜后粘连四周可出现局限性的
晶体前囊下混浊；由眼后节炎症或营养障碍可出现后囊下
混浊。囊膜下出现灰黄色颗粒混浊，逐渐加深并向四面扩展
，形成如同玫瑰花外形，其间有许多红、蓝、绿彩色点状结
晶，囊下也有空泡形成或钙化，病程较长，早期影响视力。
治疗 并发性白内障的治疗原则积极治疗原发病，对明显影响
视力的白内障行手术治疗。后发性白内障的治疗原则：YAG
激光或手术切开中心后囊和机化膜。100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com