

膀胱外翻 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/303/2021\\_2022\\_\\_E8\\_86\\_80\\_E8\\_83\\_B1\\_E5\\_A4\\_96\\_E7\\_c22\\_303221.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E8_86_80_E8_83_B1_E5_A4_96_E7_c22_303221.htm) 名称膀胱外翻所属科室泌尿外科病因 从胚胎学解释，一般认为中胚层在下腹局部未能发育，腹壁部分缺损，泄殖腔向前移位引起膀胱外翻。临床表现 下腹壁部分缺损、膀胱粘膜外翻，呈鲜红色。严重者两侧输尿管口外露，可见有尿液自两侧输尿管口呈阵性喷出。更严重者，则耻骨联合缺损，严重的尿道上裂及\*\*\*畸形。由于尿液经常浸湿裤，四周皮肤有糜烂尿臊味很浓。患者常伴有其它先天畸形，如脊柱裂、唇裂等。就一般而言，患者极易并发上泌尿系感染，但实际情况，亦有严重的膀胱外翻，生活了将近30年才来就医，检查起来生长发育生活都良好。诊断 诊断本病可一望而知，不需非凡检查。但由于多伴发其它先天畸形，故对全身及各个系统检查，都须详尽细致。并发症 脊椎裂；唇裂治疗 手术治疗除对轻型病例，仅有一小部分膀胱粘膜翻出，腹壁缺损亦甚小，可用局部修补方法得到成功。对较为重型者，局部修补多归失败，一般多在十岁后。行输尿管直肠移植，乙状结肠造瘘术处理，结果较为理想。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)