

滴虫性外阴炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/303/2021\\_2022\\_\\_E6\\_BB\\_B4\\_E8\\_99\\_AB\\_E6\\_80\\_A7\\_E5\\_c22\\_303248.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E6_BB_B4_E8_99_AB_E6_80_A7_E5_c22_303248.htm) 名称滴虫性外阴炎所属科室妇产科病因 女性的毛滴虫多寄生于尿道、前庭大腺及膀胱。前庭大腺受累者罕见。毛滴虫是一咱鞭毛虫，比多形核白细胞大许多，呈梨形，顶端有鞭毛四条，尾部有轴柱凸出，可以寄生在人体内而不引起临床症状。某些细菌可诱致滴虫活跃而产生症状，但体内抗体又可以直接或间接传播，主要通过浴池、浴具、游泳池、或未彻底消毒的医疗器械等途径间接传播。直接传播可以通过性交，从男性泌尿系统传来，患者的尿液及粪便也可能是来源。临床表现 潜伏期为4~28天，粘膜有红色小颗粒或瘀点。pH值较正常高。有多量黄绿色或灰色泡沫分泌物流出，有腥臭味，有时混有少许血液或为脓性，分泌物刺激外阴而有痒感。外阴发红，甚或出现炎性溃疡，有的因湿润及擦伤所致，可蔓延至生殖股皱襞。性交时疼痛，并可有尿痛，尿频等症状。诊断 根据症状及体征不难诊断，查到毛滴虫方能确诊。取分泌液用悬滴法检查，在镜下可找到活动的滴虫，在染色涂片中亦可见到。必要时可进行培养。滴虫感染时影响细胞，应注重与恶性肿瘤鉴别，必要时可于治疗后作细胞学检查。并发症 宫颈肥大一般不需要治疗，如有糜烂，可治疗宫颈糜烂，假如是中重度的肥大可以行宫颈锥切手术。治疗 口服灭滴灵200mg，一日3次，共7~10日。副作用小，个别病例服药物后可发生恶心，腹泻、眩晕、头痛、皮疹及颗粒白细胞减少。停药后，这些副作即消失。局部可用1%乳酸或醋酸溶液擦洗外阴及灌洗；然后，将卡巴砷或滴维净或曲古霉素塞入阴道内，7~10天为

一疗程。外用中药洗剂；鹤虱30克、苦参、狼毒、蛇床子、归尾、灵仙各15克，煎水熏洗坐浴。治疗期间注重保持局部清洁，内裤及接触外阴之用具，应煮沸消毒以防再染。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)