

小阴茎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E5_B0_8F_E9_98_B4_E8_8C_8E_c22_303497.htm 名称小阴茎所属科室泌尿外科病因 病因：小***与体内睾丸酮缺乏有关，睾丸酮缺乏是激素靶器官发育不良的结果。常伴有睾丸发育差，下降不全。另外一些器官发育（包括***）也可受累。下丘脑分泌的黄体生成素释放激素（LHRH）减少。由于垂体mdash.性腺轴未受影响，以睾丸酮治疗仍有一定效果，但是，其作用可能是微弱的。如局部应用5%睾丸酮乳膏将有助于***增大，其作用是局部激素的吸收，尔后通过全身性促进生殖系统的发育。临床表现 外生殖器尤其***较小，可无***，或不能摸到睾丸，前列腺亦特小。诊断 小***应与隐匿***区别。应排除其他内分泌和中枢神经系统的异常。骨骼的延迟生长，嗅觉缺失，学习能力低下，促肾上腺皮质激素（ACTH）和促甲状腺激素（TSH）的缺乏，都与小***有关。性功能的情况也应该具体询问。治疗 近几年，小***治疗方法有一定改进。但是，雄激素的替代仍然是主要的治疗方法。由于给患者体内提供了足够的睾酮，将刺激***的发育，并不影响骨骼的生长和闭合。Aller推荐的治疗方法为每3周口服睾酮25mg，总量不超过100mg。应通过治疗前、后的***长度测量（耻骨至***）评价治疗效果。应从一岁开始治疗。目的是使患儿生殖器官发育与身体增长保持一致。如患儿***生长比较同龄儿童差，应重复上述治疗。对伴有睾丸下降不全的患儿，应在2岁前行睾丸下降固定术。亦可应用LHRH，促进***的发育和睾丸下降。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com