

阴茎损伤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E9_98_B4__E8_8C_8E__E6_8D_c22_303506.htm 名称阴茎损伤所属科室泌尿外科病因 因为***移动性大，故***损伤甚为罕见。常见的***损伤有刺伤、裂伤、切割伤、穿透伤、剥裸、绞窄、脱位、骨折等。（一）***折断 又称***骨折。多发生在***勃起时，由暴力所致。患者可感到***局部组织破裂的声响和剧痛。***即由勃起转为松软。局部***白膜破裂，海绵体出血而形成血肿。应立即手术。否则由于血肿机化、疤痕挛缩而使***变形，导致勃起障碍。手术沿***冠状沟皮肤作环形切口，像脱袖套一样将皮肤推向***根部，清除血肿，显露破裂之***白膜，予以修补。（二）***脱位 在暴力作用下，***脚从耻骨固定处撕脱，***头部四周包皮可呈环状裂开。***脱离其覆盖之皮肤而被推挤移位到***根部、大腿根部或下腹部皮下。如合并尿道损伤，则有尿外渗和排尿困难。应尽早清创、止血、去尽血肿，将***复位，并固定于原来正常位置。较为方便的方法是置入气囊导尿管后牵引固定。（三）***皮肤撕脱 多见于***、***皮肤被转动的机器绞缠而撕脱，*****皮肤皮下组织松弛、移动性大，常为大片撕脱。但其血供常良好，彻底清创后，重新缝合，存活机会较高。否则可以植皮。但***不适宜用中厚层皮片植皮。因其难以存活，且影响***勃起，影响性交。可用转移皮瓣或全厚层植皮。也可将剥裸***埋入***皮下，***在***皮肤之一截创引出。以后再二期复位整形（图79-13）。（四）***绞窄 见于手淫或恶作剧。常为金属套环或线套所致。***因血供障碍而绞窄，远端水肿、变紫，甚至坏死。可于局部涂以润滑油后握持加压***。穿刺海

绵体吸出瘀血，高渗溶液纱布局部湿敷加压以促使水肿消退而去除嵌顿物。否则应立即设法锯开或砸碎套环。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com