

阴茎硬结症 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/303/2021\\_2022\\_\\_E9\\_98\\_B4\\_E8\\_8C\\_8E\\_E7\\_A1\\_AC\\_E7\\_c22\\_303581.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E9_98_B4_E8_8C_8E_E7_A1_AC_E7_c22_303581.htm) 名称阴茎硬结症所属  
科室泌尿外科病因 尽管目前对Peyronie疾病的熟悉还不清楚，  
但病理变化与严重的血管炎是一致的，此症与Dupuyter氏  
手掌肌腱挛缩的病理变化相似。临床表现 临床症状与体征：  
勃起时，阴茎弯曲，并有疼痛，阴茎硬结处远端勃起不坚，  
严重畸形影响性交。阴茎疲软时，无疼痛。检查 阴茎体部  
可触及局限于阴茎海绵体白膜的、不同大小的纤维性硬结或  
索状硬块，无压痛，硬结常好发于阴茎体部的远端。有此病  
人，可触及多个硬结，严重的病人在X光摄片可见钙化和骨  
化。治疗 目前，此症还没有满足治疗方法，但有50%患者能  
自然缓解，可给予对位氨基苯甲酸和维生素E口服几个月，但  
药物治疗效果是有限的。近几年，对一些顽固性患者可行手  
术切除硬结，而后行皮肤移植。Das(1980年)报道硬结切除后  
应用睾丸鞘膜移植成功。Bruskewitz和Raz(1980年)报道硬结  
切除后在阴茎海绵体内植入阴茎假体。另外还可行放疗，  
局部注射类固醇药物，二甲基硫氧化物(DMSO)和甲状旁  
腺素，这些治疗效果报道的资料不多 100Test 下载频道开通，  
各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)