

习惯性髌骨脱位 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E4_B9_A0_E6_83_AF_E6_80_A7_E9_c22_303895.htm 名称习惯性髌骨脱位

所属科室骨科临床表现 膝关节不明显的外伤，或股四头肌强烈收缩，即可引起脱位。多数患者经常脱位，在屈膝时髌骨脱于股骨外髌外侧，伸膝时自然复位。股四头肌萎缩，伸膝无力，易摔跤。但无明显的疼痛。治疗习惯性髌骨脱位的治疗，年龄越小效果越好。不仅能解决脱位问题，还可避免继发畸形。假如治疗较晚，全出现髌、膝关节继发屈曲、腰前凸加大等畸形。甚至膝关节骨性关节炎，影响工作与生活。实践证实手术治疗，能取得明显的效果。手术方法很多，归纳起来有以下几种。（一）软组织手术，包括：1.膝内侧肌膜、关节囊、股四头肌扩张部分紧缩缝合术。2.肌膜移位术（Campbell），内侧肌膜、肌肉带蒂移位术（Krougius）。3.肌腱移位术，将内侧绳肌移位，加强肌回头肌内侧力量。（二）股骨下端手术 对股下端内旋、膝内翻以及股骨外髌发育不良者，分别做股骨髌上截骨、股骨外髌抬高术（Albee）。（三）髌韧带移位术（Houser）在儿童做半侧髌韧带移位术（Goldthwait）。（四）髌股关节成形术 修整髌骨外形，加深股骨髌凹，将四周软组织垫于其间。孟继懋提出，习惯性髌骨脱位，局部结构发育畸形各有不同，不是某一种手术能解决。应根据不同的畸形，采用综合手术治疗。并倡用股内侧肌移位加强内侧牵拉力量。手术方法是：1.将膝关节外侧挛缩的软组织松解。2.将膝内侧关节紧缩缝合并将股内侧肌止点移到髌骨外侧。3.根据具体情况做Houser手术或Goldthwait

手术。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com