

桡骨小头骨折 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/303/2021\\_2022\\_\\_E6\\_A1\\_A1\\_E9\\_AA\\_A8\\_E5\\_B0\\_8F\\_E5\\_c22\\_303928.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E6_A1_A1_E9_AA_A8_E5_B0_8F_E5_c22_303928.htm) 名称桡骨小头骨折  
所属科室骨科临床表现 局部疼痛，肘外侧轻度肿胀，桡骨头四周有明显的压痛。前臂旋转活动受限，被动活动时疼痛，尤其是在旋后时明显。肘关节屈伸活动不受限，但活动时疼痛。X线摄片，可明确诊断与类型。治疗 裂纹骨折，短期内固定后，即可开始活动。一般移位不多者，在伸直位牵引，并在内收位旋转前臂，使骨折的桡骨头恢复其圆形或接近圆形，以免障碍前臂旋转活动。复位后用石膏托固定。2~3周后除去石膏托练习肘关节活动。粉碎型骨折有移位或复位不满足者，应考虑早期做桡骨头切除术，手术只限于成年患者。切除不能低于桡骨结节关节面。将断端修平，清除四周碎骨片后，将四周软组织覆盖在桡骨断端粗糙面上缝合。术后用三角巾悬吊肘关节于功能位，2周后即可开始活动。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)