

子宫颈撕裂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E5_AD_90_E5_AE_AB_E9_A2_88_E6_c22_303963.htm 名称子宫颈撕裂所属科室妇产科临床表现临床上可表现为以下三种不同类型：
一、宫颈外口撕裂与一般足月分娩时撕裂相同，多发生于宫颈6或9点处，长度可由外口处直达穹窿部不等，常伴有活跃出血。
二、宫颈内口撕裂内口尚未完全扩张，胎儿即强行通过时，可引起宫颈内口处粘膜下层结缔组织撕裂，因粘膜完整，故胎儿娩出后并无大量出血，但因宫颈内口不全以致日后出现习惯性流产。
三、宫颈破裂凡裂口在宫颈部以上者为上段破裂，一般同时合并有后穹窿破裂，胎儿从后穹窿裂口娩出。如破裂在宫颈的部为下段破裂，可发生在宫颈前壁或后壁，但以后壁为多见。裂口呈横新月形，但外口完整。患者一般流血较多。窥阴器扩开时即可看到裂口，甚至可见到胎盘嵌顿于裂口处。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com