

单纯性外阴炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E5_8D_95_E7_BA_AF_E6_80_A7_E5_c22_304188.htm 名称单纯性外阴炎
所属科室妇产科病因主要由于不注重外阴卫生而受到下列因素的刺激：（一）分泌物刺激：由于分泌物增多或经血、月经垫刺激，非凡是宫颈炎及各种炎时，分泌物增多，流至外阴，均可产生不同程度的外阴炎。（二）其他刺激因素：如糖尿病患者的含糖尿液直接刺激：尿屡患者长期受尿液浸渍；粪瘘患者当腹泻、便秘时受粪便刺激；肠道蛲虫。（三）混合性感染：由于多方面的刺激，常引起混合性感染，致病菌常为葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌。临床表现急性期可见外阴肿胀、充血、糜烂，有时形成溃疡或成片的湿疹。患者自觉外阴部灼热、瘙痒或疼痛，排尿时尤甚。严重者腹股沟淋巴结肿大，压痛，体温可稍升高，白细胞增多。糖尿病性外阴炎，外阴皮肤发红、变厚，常呈棕色，有抓痕。由于尿糖有利于霉菌生长繁殖，故常并发白色念珠菌感染。慢性炎症时外阴瘙痒，呈苔藓化。诊断（一）具体询问病史，分泌物多少、性状，有无非凡因素。对老年患者要注重有无糖尿病病史；对年轻者注重有无蛲虫。注重了解患者的卫生习惯。（二）检查分泌物有无非凡感染，如霉菌、滴虫、阿米巴等。（三）必要时查尿糖，查大便虫卵。治疗（一）病因治疗：首先应针对原因进行治疗，除去病因，如治疗糖尿病、肠道蛲虫、进行瘘管修补、治疗宫颈炎及各种原因的***炎。急性期应少活动，较重者应卧床休息。注重营养，增强反抗力，必要时，针对致病菌口服或肌注抗生素。（二）局部治疗：1/5000高锰酸钾液坐浴，涂布紫草油或抗生素软

膏，如四环素或金霉素软膏等。100Test 下载频道开通，各类
考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com