

传染性红斑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E4_BC_A0_E6_9F_93_E6_80_A7_E7_c22_304380.htm 名称传染性红斑所属科室皮肤科病因 由于本病常在儿童中集体发生，有些学者认为本病是一种病毒性传染病，但未分离出病毒。也可能是一种肠道病毒。临床表现 潜伏期为5~14天。病人多数为4~12岁儿童。常忽然发疹而无全身症状，仅少数病人稍微发热，有时出现咽痛、呕吐、眼结膜及咽部充血。皮疹首先出现在面颊部、呈水肿性蝶形红斑，边界清楚，其上无鳞屑，局部温度增加，偶有微痒和烧灼感。皮疹不发生于口唇四周。经过1~2天后，在躯干、臀部及四肢出现对称性边界清楚花边状或网状斑丘疹，为本病特征。4~5天以后，红斑自颊部及躯干上消退。皮疹消退次序和出疹次序相同。皮疹消退后不脱屑。有时复发。常见于春季，病程10天左右。预后良好。检查 1.血常规 白细胞正常或略低，淋巴细胞和嗜酸性粒细胞增加。 2.组织病理 表皮细胞水肿，真皮乳头层血管扩张，内皮细胞肿胀，在血管、毛囊及汗腺四周有慢性炎细胞浸润。诊断 根据面部有蝶形水肿性边界清楚的红斑。具流行性、全身症状稍微。常见于春季的儿童，即可诊断。鉴别诊断（1）猩红热 本病呈急性病容，临床表现咽痛、高热、皮疹为弥漫性红斑，口周有苍白圈，草莓舌及愈后脱皮等征象。帕氏征：阳性。（2）风疹 上呼吸道卡他症状较明显、发热、麻疹样皮疹，耳后、枕后淋巴结肿大。（3）麻疹 高热、上呼吸道卡他症状明显、皮疹为斑丘疹，皮疹之间有正常皮肤。早期颊粘膜可见费克斑（Koplik斑）。治疗 患病期间，需要隔离至皮疹消退为止。一般对症治疗，无需非凡处理。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com