

汗疱疹 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E6_B1_97_E7_96_B1_E7_97_87_c22_304391.htm 名称汗疱疹所属科室皮肤科病因 本病的病因尚未完全清楚，过去认为是由于手足多汗、汗液潴留于皮内而引起，现在多认为汗疱疹为一种皮肤湿疹样反应。精神因素为激发本病的重要因素。近来有人发现镍过敏亦可引起。临床表现 典型损害为位于表皮深处的小水疱，粟粒至米粒大小，呈半球形略高出皮面，无炎症反应。分散或成群发生于手掌、手指侧面及指端，少见于手背、足底，常对称分布。水疱内含清亮浆液，干涸后形成领口状脱屑露出红色新生上皮，薄而嫩。有程度不等的瘙痒及烧灼感。本病好发于春秋季节，常每年定期反复发作。诊断 季节性发作，对称发生于手掌，损害为小水疱，深在，疱壁紧张，干涸后脱皮治疗 皮质类固醇激素霜剂或软膏外用，局部反复脱皮、干燥疼痛者，可外用2%~5%水杨酸软膏、10%尿素脂。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com