

疱疹样湿疹 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E7_96_B1_E7_96_B9_E6_A0_B7_E6_c22_304449.htm 名称疱疹样湿疹所属
科室皮肤科病因 由单纯疱疹病毒或牛痘病毒引起在患有湿疹、异位性皮炎及脓疱病的婴幼儿忽然发病。从细胞涂片可见单纯疱疹病毒引起的病毒包涵体在细胞核内，牛痘病毒引起的在细胞浆内临床表现 多发生于5岁以内的儿童，亦可见于成人，感染单纯疱疹病毒后，约经5~9天潜伏期，忽然高热（39~40℃）、全身不适、恶心、呕吐及嗜睡等中毒症状。皮疹开始于面部、颈、上肢及躯干等原有皮肤病部位，也可以发生在正常皮肤上。下肢少见。皮疹特点：原有皮疹加重，忽然出现许多密集的水疱，迅速变为脓疱、疱顶有脐窝、基底明显红肿。有时皮疹融合成片状，经过1~2周后皮疹干燥结痂，遗留色素沉着及浅表性疤痕。四周淋巴结肿大。可并发咽炎、扁桃体炎、鼻炎、中耳炎、结膜炎、角膜炎或角膜溃疡、肺炎及脑炎等。检查 1.血常规 白细胞减少 2.用Tzanck细胞学检查法 疱底涂片可见有巨细胞。 3.组织病理 表皮内或表皮下可见水疱或脓疱，有网状变性和气球变性，常有多核上皮细胞，真皮有大量炎细胞浸润，以中性白细胞为主。诊断 1.诊断 根据有单纯疱疹接触史和临床特点，在原有湿疹皮肤上出现多个脐窝状水疱和脓疱、伴全身症状即可诊断。 2.鉴别诊断 （1）牛痘性湿疹 本病有种痘史，组织病理检查：基底层细胞原浆内有牛痘病毒包涵体。（2）水痘 发疹前全身症状稍微，无原发湿疹等皮疹。（3）天花 有传染流行病史，无原发湿疹病史，全身症状重，有密集的脐窝状脓疱。（4）脓疱病 脓疱表浅，易破形成蜜黄色脓痂，脓

疱不呈脐窝状，无全身症状。治疗 1.有湿疹、异位性皮炎等皮肤病患儿，应避免接触单纯疱疹病人。 2.发病后及时隔离，卧床休息、多饮水，多吃营养丰富、易消化的食物。加强护理。 3.全身及局部治疗可与单纯疱疹治疗相同。对严重患者，可肌注丙种球蛋白，每次3~6mL，每日或隔日1次。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com