

结核性苔藓 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/304/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BB\\_93\\_E6\\_A0\\_B8\\_E6\\_80\\_A7\\_E8\\_c22\\_304487.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E7_BB_93_E6_A0_B8_E6_80_A7_E8_c22_304487.htm) 名称结核性苔藓所属科室皮肤科病因 被认为是结核疹的一种。多发生于儿童及青年。患者常有淋巴结、骨、关节及其他皮肤结核病。结核菌素试验阳性，但在皮疹中常查不到结核杆菌。对结核菌素有高度反应的人注射结核菌素会发生本病。近年schuhmachers报告本病与泛发性丘疹型环状肉芽肿相似。病理 真皮上部毛囊四周结核样浸润。主要为上皮样细胞群，四周有或无淋巴细胞，偶见巨噬细胞。无干酪样坏死。毛囊上皮细胞变性，因角化过度，毛囊口可见角栓形成。临床表现 针头至米粟大的圆形小丘疹往往发生于躯干及四肢。以肩部、腰部及臀部为最多。初起丘疹播散，以后逐渐聚集成椭圆形、圆形或环形。丘疹经常出现在毛囊口处，顶端略尖或扁平，有角质小棘，常有少许糠状鳞屑。丘疹为正常皮色或淡红色，部分病人丘疹的顶端有很小的脓疱，无任何自觉症状，有些病人轻度瘙痒。本病经过缓慢，数月或数年之后，丘疹自然消失，消退后不留任何痕迹或留有暂时性色素沉着。但本病可以再发。诊断 根据对称分布于躯干部的苔癣样丘疹，无自觉症状，结合以往有结核病史及病理学改变，一般诊断不难，但需与以下疾病相鉴别：1.维生素A缺乏病 毛囊角化的小丘疹，中心有角质栓，多发生于四肢伸侧。多伴有夜盲及角膜软化等症状。2.小棘苔癣 毛囊性角化的小丘疹密集成片地发生于颈部及臀部，无任何自觉症状。3.光泽苔癣 损害为小米粒大小的圆形扁平丘疹，正常皮色，各自独立而不聚合，表面光滑并有闪烁的光泽。多半发生于腹部及臀部，无自觉症状。

4.丘疹状湿疹为红色丘疹，常与水疱、红斑同时存在，急性发作，剧烈瘙痒治疗病人要注重一般健康及营养。寻找结核性病灶并作适当处理。内服药为异烟肼治疗，但本病有自愈性，通常不必治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)