

松毛虫皮炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/304/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9D\\_BE\\_E6\\_AF\\_9B\\_E8\\_99\\_AB\\_E7\\_c22\\_304562.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E6_9D_BE_E6_AF_9B_E8_99_AB_E7_c22_304562.htm) 名称松毛虫皮炎所属

科室皮肤科病因 松毛虫皮炎本病常见于种植马尾松的丘陵地带，多发生于从事农、林业劳动的青壮年。以5~11月份多见。临床表现 一般在接触毒毛后几分钟到几十分钟内发病。其皮疹分布及表现和桑毛虫皮炎相似。发疹后1~2天至10余天，部分患者可出现关节症状，以暴露部位的手、足小关节较常受累，多不对称。可有关节红、肿、热、痛及活动受限，多于3~7天后消退，少数可迁延一至数月。部分患者仅有关节炎症状而无皮炎史。重者可伴低热等全身症状。诊断 治疗 局部治疗以消炎、止痒和防止继发感染为主，常外搽炉甘石洗剂等。关节炎可酌情选用非甾体类抗炎药，必要时采用皮质激素。关节炎消退后注重功能锻炼，以防止关节畸形。预防及预后 预防重在灭虫，采用药物喷杀或生物灭虫（用松毛虫天敌赤眼蜂或红头小茧蜂等）。在松毛虫大发生之前及时摘除虫卵块和茧，捕捉幼虫及诱杀成蛾等。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)