

先天性肩关节脱位 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E5_85_88_E5_A4_A9_E6_80_A7_E8_c22_304567.htm 名称先天性肩关节脱位

所属科室骨科病理肩关节由于骨性或四周软组织先天性缺如，可发生肩关节前、后、下三个方向脱位。临床表现肩关节外形及功能受限程度根据畸形严重程度不同，肩关节盂或肱骨头发育不良或缺如可使畸形加重，肩关节不稳定性增加常合并上肢骨畸形（图1）。图1 肩关节脱位合并上肢畸形

（A）正面（B）背面（C）肩关节脱位诊断根据病史、临床表现和X线摄片不难作出诊断。并发症合并上肢骨畸形。治疗当肩关节功能受影响比较轻者，可不必手术治疗，因术后可能使功能进一步丧失。Whitman提倡手法复位，但治疗后很轻易发生肩关节再脱位。手术治疗则根据不同情况采用肩关节囊内折术、肌腱移位、肩关节功能位融合以及肩峰畸形骨块隆起切除术。但这些手术有可能限制肩关节活动。对严重肩关节发育不良者，手术通常无效，无法改善其功能。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com