

蜂螫伤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/304/2021\\_2022\\_\\_E8\\_9C\\_82\\_E8\\_9E\\_AB\\_E4\\_BC\\_A4\\_c22\\_304988.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E8_9C_82_E8_9E_AB_E4_BC_A4_c22_304988.htm) 名称蜂螫伤所属科室普

通外科诊断1.局部表现螫伤部位红肿，中心可见小黑点，多为刺伤点或毒刺存留部位，四周可有丹毒或荨麻疹样改变。2.全身症状一般不甚明显，但被群蜂多处螫伤时症状较重。可出现头晕、头痛、寒战、发热、气喘、心率增快、血压下降甚至休克、昏迷等。治疗1.螫伤后立即设法拔除毒刺。局部可用肥皂水、10%氨水或5%小苏打水冲洗。2.伤口四周外敷南通蛇药。3.用0.25%~0.5%普鲁卡因行伤口四周封闭。4.重症者住院治疗，依病情使用抗组织胺药物。过敏反应明显者可使用肾上腺素或10%葡萄糖酸钙等。5.适当使用止痛、镇静剂。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)