

疔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/305/2021_2022__E7_96_96_c22_305000.htm 名称疔所属科室普通外科病因其病原菌主要是金黄色葡萄球菌、其次为白色葡萄球菌侵入毛囊或汗腺所致。皮肤擦伤、糜烂等均有利于细菌侵入及繁殖。皮脂溢出过多及因职业而常与矿物油接触的人，也轻易发生疔子。疔病多半发生于炎热的夏季。高温、潮湿、多汗轻易使病原菌侵入皮肤。皮肤不清洁是一个重要因素。身体抵抗力降低、体弱、糖尿病、肾脏炎、贫血等皆可成为本病的诱因。临床表现开始时在毛囊处有一个红色炎性高起的小丘疹，以后逐渐增大，成为圆形结节，表面皮肤紧张，局部红、肿、热、痛。边缘不太清楚。以后结节逐渐成熟，中心变软，触之有波动感，表面皮肤变薄、中心顶端出现一个黄点。不久溃破排出脓汁和坏死组织，疼痛立即减轻，红肿渐渐消退，终于愈合并遗留瘢痕。有时，红肿的结节渐渐吸收既不化脓也不溃破。辅助检查组织病理以一个毛囊、皮脂腺或汗腺为中心，形成小脓肿。病变处，正常组织结构破坏。由大量的脓细胞、嗜中性粒细胞和坏死组织形成的脓汁内含有病原菌。破溃排脓后，由肉芽组织修复，终于变成纤维性瘢痕。鉴别诊断1.多发性汗腺脓肿也在夏季发病，多见于婴幼儿及体弱的产妇产的头、额等处。皮损为多发性皮下脓肿。表面压痛、炎症较轻。无脓栓，遗留瘢痕。通常伴有很多痂子。一般人称为痂毒。也有人称为假性疔病（Pseudofurunculosis）。2.化脓性汗腺炎多见于青年女性，皮损为皮下硬结。形成皮下脓肿，随后表皮红、肿、热、痛、破溃结疤。皮损好发于腋下、腹股沟、生殖器及肛周、脐周等。治疗1.注重皮肤卫生，禁

食辛辣刺激性食物及酒类，最好不多吃甜食。千万不要用挤捏的方法去排脓。尤其是面部和上唇的疖子。对于反复发作的疖病，要寻找潜在的因素，消除体内感染病灶。检查有无贫血和糖尿病等情况，一旦发现要及时治疗。

2. 抗生素的注射和内服。早期应用足量抗生素。首选青霉素，也可用洁霉素0.6g肌注，每日两次，也可用先锋霉素、泰利必妥及磺胺等。

3. 自家疫苗或葡萄球菌混合菌苗疗法、自血疗法。也可皮下注射转移因子2mg/次，每周两次，五周为一疗程。

4. 早期的疖子不能切开引流。成熟的疖子已化脓变软者，可切开排脓。但面部和上唇的疖子千万不要挤压和随意切开。未成脓者，可每日外用纯鱼石脂，或鱼石脂硫磺泥膏，可促进炎症消退。

5. 可进行紫外线、红外线、超短波照射，缓解炎症。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com