

阴虱病 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/305/2021_2022__E9_98_B4_E8_99_B1_E7_97_85_c22_305017.htm 名称阴虱病所属科室皮肤科病因 虱根据其形态和寄生的部位不同，可分为头虱（head louse），体虱或衣虱（body louse or clothes louse），阴虱（pubic louse）三种。分别寄生在人的头发、内衣和**上。均吸人血而生活，同时放出有毒的唾液，叮刺及毒液均能引起瘙痒性皮炎。衣虱传染回归热，流行性斑疹伤寒及战壕热。阴虱一般不散布传染病，但个别报告在某种情况下，有传染斑疹伤寒的可能。阴虱较人头虱及人体虱宽短，雌虱体长1.5times.1.2mm，有足三对，前足细长，其余两对有钩形巨爪，胸腹相连无明显分界，腹部短宽，略似螃蟹，通常以巨爪紧握住**和肛毛。而播散到腋毛，眉毛或睫毛上不多见。一般是抓住四周毛发而用口器吸血，也可爬伏在皮肤上而像灰黄色小粒，一般限于**或下腹部，虱卵斜伏在**上。为铁锈色或淡红小粒，有时似点状血痂，轻易与白色的头虱卵鉴别。阴虱畏光喜阴处，昼夜均能活动，当温度过高或过低时，都静伏不动。雌、雄成虫，交配后24小时内受精，雌虫开始产卵。阴虱产卵少而小，至其死亡前24-48小时，大约每日产卵3个，一生产卵约50个，成虫生活时间约为30天，脱离宿主24小时内死亡。虱为不全变态，生活史中有卵，若虫及成虫三期，整个生活周期均在宿主身上完成。雌虫产卵时分泌胶液，使卵牢固地粘附在毛发或织物纤维上。临床表现 阴虱聚居在阴部及会**上。具有一定的游移性，**部位及其四周瘙痒，搔抓引起抓痕，血痂或继发脓疱疮、毛囊炎等感染，有时被咬处见黄豆大或指甲大青斑，即刚灰色色素性小斑点

，一般不超过1cm直径，这种斑点可能是皮肤对阴虱涎液的过敏反应，也有人认为是由于阴虱吸血时，唾液进入血液而使血红蛋白变色，虱咬处微量出血，该处变为青斑。杀灭阴虱后，青斑可继续存在数日。在毛囊口可找到阴虱，毛干处可找到铁锈色虱卵。检查 标本采集：用剪刀剪下有阴虱和虫卵的***。标本固定：选下列固定液固定：70%酒精或5%-10%福尔马林溶液。将固定后的标本放在玻片上，滴一滴10%氢氧化钾溶液，放在酒精灯上略加热，显微镜观察。结果：阴虱呈蟹形，有3对足，前足较小，中后足巨大，有粗大爪能抓住***。虫卵为铁锈色或淡红色。诊断 患者自己即可以做出诊断，在寄生处查到虫或虱卵。镜下观察其特征。治疗 ***最好剃掉，内衬裤要煮洗或熨烫，外用1%马拉硫磷（malathion）粉剂，中药有25%~50%百部酊，1%r-666霜或25%苯甲酸苄酯乳剂都能灭虱，也可以用灭害灵局部喷雾，3分钟后清洗。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com