

脆弱性骨硬化 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/305/2021_2022__E8_84_86_E5_BC_B1_E6_80_A7_E9_c22_305023.htm 名称脆弱性骨硬化所属科室骨科病理 在海绵质骨内肉眼可见灰白色的圆形或卵圆形，边缘不整洁，形似骨瘤的小骨块，与皮质及关节软骨无关。镜下见这些斑点是由许多比较有规则排列、比正常厚的骨小组成，厚度不等，其结构像海绵质骨，多数与长骨的长轴平行，其边缘逐渐移行于松质骨之中，无明确的分界线，其他骨结构正常。临床表现不产生症状，有20%的病人诉关节疼痛，尤其在骶椎，但不知是骨中的斑点所致还是合风湿痛。有时出现皮肤结节状组织增生和易形成疤痕疙瘩。X线表现可见圆形或卵圆形的密斑点，几乎波及全身，非凡是在长骨的骨骺部位及干骺端，但骨干很少有斑点。斑点的大小不一，直径大约由2mm~10mm数目不等。在脊柱、肋骨及锁骨均少见，在颅骨更稀有。骨骼的轮廓改变，骨骺发育亦无影响，关节间隙正常。在成人，斑点一般不再有明显变化，而在儿童则斑点可以增加，消失及融合。诊断完全依靠X线作出诊断。在X线上要与下列疾病作区别。肢骨纹状肥大、软骨发育异常（Ollier病）、转移性癌等。治疗无症状、无畸形，不需任何治疗。预防及预后良好，不影响发育及生命过程。但有人报告1例骨斑点症有肉瘤变。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com