

肛乳头炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/305/2021\\_2022\\_\\_E8\\_82\\_9B\\_E4\\_B9\\_B3\\_E5\\_A4\\_B4\\_E7\\_c22\\_305026.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/305/2021_2022__E8_82_9B_E4_B9_B3_E5_A4_B4_E7_c22_305026.htm) 名称肛乳头炎所属科室普通外科病因排便时创伤或肛窦炎症都可引起肛乳头的急性炎症，由于引流不畅及炎症的长期刺激，使肛乳头肥大。经过多次的排便动作使肛乳头逐渐伸长而成为带蒂的肿物，形似直肠息肉。诊断1. \*\*\*不适和隐痛。2. \*\*\*瘙痒和易潮湿，很少出血。3. 排便时肥大的乳头可脱出\*\*\*外，为色白质硬的结节。4. 指肛检查可触到变硬的乳头。5. \*\*\*镜检查可见齿线处充血水肿。治疗1. 口服抗生素，如四环素、红霉素等。2. 局部外用抗生素软膏。3. 保持大便通畅，每日可服缓泻剂。4. 脱出\*\*\*外的带蒂乳头，可以钳夹蒂部切除后以丝线结扎。5. 热水坐浴或1：5000高锰酸钾溶液坐浴。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)