

食管破裂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/305/2021_2022__E9_A3_9F_E7_AE_A1_E7_A0_B4_E8_c22_305107.htm 名称食管破裂所属

科室心胸外科病因(1)刀枪伤及火器伤及食管。(2)胸部钝挫伤

。(3)误吞异物可刺破食管。(4)食管镜检查时可误伤食管

。(5)剧烈呕吐或其他因素使腹内及食管内压力急剧增加时，

也可引起自发性食管破裂。临床表现早期可有突发性胸痛或

上腹部疼痛，且向肩背部放射，并有发热、气促及呼吸困难

等。食管损伤后症状与损伤部位有关：(1)颈段食管破裂时，

主要表现为颈部疼痛，吞咽困难及声音嘶哑。(2)胸段食管破

裂时，主要表现为胸骨后或上胸部剧烈疼痛；食管穿孔进入

胸膜腔时，可引起液气胸，因而可有患侧胸痛、呼吸困难及

紫绀等症状。(3)腹段食管破裂时，可出现上腹部腹膜炎症状

。诊断1)有外伤、呕吐或食管镜检查等可致食管破裂病史。

(2)早期可有突发性胸痛或上腹部疼痛，且向肩背部放射，并

有发热、气促及呼吸困难，颈部可扪及皮下气肿等。(3)食管

破裂穿孔后症状。(4)外周血白细胞计数增高。(5)X线检查可

见纵隔影增宽或积气及一侧或双侧胸腔积液积气。(6)食管碘

油造影时可确定破裂部位。(7)胸腔穿刺有含食物的液体（多

为酸性液体）抽出时可诊断；也可口服美蓝后穿刺可抽出蓝

色液体，也可诊断。100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com