

良性纤维组织细胞瘤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/305/2021\\_2022\\_\\_E8\\_89\\_AF\\_E6\\_80\\_A7\\_E7\\_BA\\_A4\\_E7\\_c22\\_305253.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/305/2021_2022__E8_89_AF_E6_80_A7_E7_BA_A4_E7_c22_305253.htm) 名称良性纤维组织

细胞瘤所属科室骨科病理1.肉眼所见 骨膜及皮质旁结缔组织正常，骨皮质变薄但连续。肿瘤致密，由胶冻状物质或少量纤维样物质组成，呈皮革样黄色，有时有鲜亮黄色斑点。在此组织旁边可有较软的组织，浅棕或淡红棕色，象骨巨细胞瘤，肿瘤与四周骨界线清楚。2.镜下所见 细胞丰富，胶原呈涡旋状或迭层状排列。细胞有类圆—椭圆核，可顺纤维方向伸长。有丰富的大泡沫状细胞，可孤立或成群存在。多核巨细胞稀少而小，有丝分裂像很少见。在某些区域（大体病理的骨巨细胞瘤区域）可观察到相同于骨巨细胞瘤的结构。临床表现 发病罕见，到目前为止，只有几例报告，因此很难作出准确的性别、年龄和部位的统计。此病一般在成人发病，好发于长骨的干骺端。也见于骶骨、髌骨和下颌骨。症状为持续的中等度疼痛和肿胀。辅助检查 X线所见为溶骨病变，位于长骨的干骺端，表现为圆形偏心性，有时被一骨硬化细线分隔而显得界线清楚，骨皮质变薄，有时轻度膨胀。在较小的骨，如腓骨头，可占据整个骨段，有时部分骨皮质可消失，但无骨膜反应。鉴别诊断需同非骨化性纤维瘤和骨巨细胞瘤鉴别。治疗 手术治疗。因为良性纤维组织细胞瘤一般为良性肿瘤分期的 Ⅰ期（活跃性），所以采用刮除术，可联用局部辅助剂；如切除彻底，一般都能治愈。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)