

骨软骨瘤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/305/2021\\_2022\\_\\_E9\\_AA\\_A8\\_E8\\_BD\\_AF\\_E9\\_AA\\_A8\\_E7\\_c22\\_305765.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/305/2021_2022__E9_AA_A8_E8_BD_AF_E9_AA_A8_E7_c22_305765.htm)

名称骨软骨瘤所属科室骨科临床表现 病人多为青少年，局部有生长缓慢的骨性包块，本身无症状，多因压迫四周组织如肌腱、神经、血管等影响功能而就医，多发性骨软骨瘤可妨碍正常长骨生长发育，以致患肢有短缩弯曲畸形。辅助检查 X线表现为骨性病损自干骺端突出，一般比临床所见的要小，因软骨帽和滑囊不显影，肿瘤的骨质影像与其所在部位干骺端的骨质结构完全相同。不易区别。位于长骨的肿瘤其生长方向与邻近肌肉牵引的方向一致，例如股骨远端的骨软骨瘤向股骨的生长，胫骨近端的肿瘤向胫骨远端生长。其外形不一，可有一个很长的蒂和狭窄的基底。或很短粗呈广阔的基底，较大的肿瘤其顶端膨大如菜花治疗 一般不须治疗，若肿瘤过大，生长较快，或影响功能，应考虑作切除术，切除范围应较广，要包括肿瘤基底四面部分正常骨组织，以免遗漏，引起复发。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)