

包皮***炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/305/2021_2022__E5_8C_85_E7_9A_AE_2A_2A_2A_E7_c22_305940.htm 名称包皮***炎所属科室泌尿生殖外科临床表现包皮***炎表现为包皮红肿、灼痛、排尿时加重、可有脓性分泌物自包皮口流出。如将包皮翻转，可见包皮内板和***头充血、肿胀、重者可有浅小溃疡或糜烂，表现有脓液。诊断药物过敏所引起的包皮龟炎是一种延迟型变态反应，临床上颇为常见，一般在眼药后24~72小时发病。并发症继发性包茎；尿道外口狭窄；前尿道狭窄 治疗包皮***炎时书法部可有1/5000高锰酸钾液浸洗并敷以消炎软膏。过敏性包皮***炎须口服抗过敏药物及外用考的松类软膏。如因包茎或包皮水肿不能翻转浸洗、引流不畅，经一般治疗炎症仍不能消退时，可行包皮背切开术（图1），以利引流。俟炎症完全消退后再行包皮环切术。图1 包皮背侧切开术预防及预后经常清洗包皮和***头，保持包皮腔内清洁和干燥。如有包皮过长或包茎时应行包皮环切术。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com