

睾丸扭转 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E7_9D_BE_E4_B8_B8_E6_89_AD_E8_c22_306184.htm 名称睾丸扭转所属科室泌尿生殖外科病因睾丸通过被称为睾丸系膜的组织与**相连，由睾丸系膜将睾丸固定于**。

有的胎儿在发育时就会产生一侧或两侧睾丸系膜过长，出生后，睾丸与精索的活动度就很大，万一遇上忽然用力或猛烈震荡等情况，睾丸与精索就会发生360度以上的扭转临床表现睾丸扭转发病急骤，来势凶猛，患病一侧睾丸和**会剧烈疼痛。扭转初起时疼痛还局限在**部位，以后会向下腹和会阴部发展，同时还会伴有呕吐、恶心或发热，阴部出现红肿、压痛。由于精索也随之扭转，精索内的血管被阻断，睾丸缺乏血液供给，如不及时治疗，睾丸会发生缺血性坏死，颜色发黑，逐渐萎缩以致功能丧失。睾丸扭转的临床表现主要是痛、肿。假如是发生在小儿，诊断往往更不轻易，一般小儿会有不明原因的厌食，躁动不安，病情一般发展较快，有时往往因为没有确定诊断而延误治疗，给患者造成不必要的伤害。鉴别诊断

- 1.急性附睾炎：患者往往有发烧，尿检可见细胞或脓性细胞，主要是炎症表现。
- 2.**血肿：这类病人主要有明显的外伤史。
- 3.鞘膜积液：这是一种慢性发展的疾病，一般情况下不会很痛。
- 4.睾丸附睾扭转：这类疾病一般是青年人多发。假如患者出现睾丸肿胀，不发烧，医生就会怀疑可能是睾丸扭转，要立即进行探查手术。治疗手术则是可靠有效的治疗方法，不仅可以治疗发生扭转的睾丸，还可以预防健康一侧睾丸发病。手术中，应该视具体情况进行治疗。术中可见睾丸呈黑紫色，将rdquo.松解后，观察血液循环恢复情况，半小时以内，假

如血液运行逐渐恢复，黑紫的睾丸逐渐变红，表示病变时间较短，睾丸功能已经恢复，可以保留。假如手术中睾丸颜色没有恢复，则表示已经坏死，应该切除。因为近几年医学研究发现，坏死的睾丸可以通过体内的血睾屏障，形成抗精子抗体，轻易影响另外一侧睾丸的功能。一般手术中除了对扭转的睾丸进行治疗外，通常健康一侧的睾丸也要进行固定，因为两侧的发病几率往往相似，一侧发病，另一侧或早或晚也会发病。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com